


37.
No. 37

Observation

a l'anné
~~Par M. le Docteur~~



une hydrocèle, avec Suppuration du testicule.

un jeune homme de dix sept ans, d'une Constitution
assez délicate, ayant eu, à l'âge de cinq ans, une
hernie inguinale, du côté droit, de laquelle, dans l'espace
de dix à douze mois, sortoit de temps en temps, sans
jamais descendre plus bas que l'aîne, ni sur passer
en grosseur le volume d'une noix, en a été guéri, en
portant, pendant environ deux ans, un bandage élastique.
quelques temps après, sans savoir à quoi l'attribuer,
il s'aperçut que le testicule du même côté, étoit plus
gros, que l'autre: il vit même le gonflement
augmenter successivement. il ne pensa à consulter, que
quand il commença à le gêner. alors Diversité
d'opinions. les uns prétendoient que la hernie étoit



ARC 18d. 5m° 37

devenue Comptette, d'autres, que c'étoit un Sarcocele.
mon père & moi jugeâmes que c'étoit une hydrocele & qu'il étoit convenable d'en observer le progrès.

Ce jeune homme nous consulta de nouveau, il y a environ trois ans. La tumeur n'incommodoit de temps à autre & bien plus, pendant l'été, que pendant l'hiver, ce que nous attribuâmes à l'exercice & aux fatigues de la chasse; il continua à supporter cette gêne, sans se plaindre.

un jour des vacances de 1787, il en souffrit, après un excès de fatigue, au point qu'il fut obligé de se mettre au lit. M. Fougère n'ayant pas à même de consulter, vu l'éloignement, lui fit appliquer un Cataplasme de mie de pain & de lait dont il éprouva un soulagement notable. Dès le lendemain il

retourna à la Chasse et continua à Vaquer à ses
Exercices et occupations.

Pendant l'hiver suivant, il se livra à
l'Exercice, dans le projet de devenir militaire,
il prenoit deux Leçons, par jour. Son goût, pour
ce genre d'exercice, lui faisoit oublier son incom-
modité et il tira des armes, jus qu'à la fin de
cette année. Le testicule étoit alors du volume
du poing et n'occasionnoit aucune douleur.

La tumeur étoit allongée, un peu étranglée,
à l'endroit de l'anneau où l'on sentoit le
Cordon plus gros qu'il ne devoit être, malgré ce
étranglement, tel qu'il se trouve communément,
dans les Hydrocèles et dans les Sarcocèles.
un homme de l'art Confuté, prétendoit que
cette tumeur étoit une hernie.

Les choses étoient en cet état, lors que



Le 25 9^{bre} dernier, le jeune homme, en descendant
d'un grenier, avec un panier de fruits, pour le
porter à la cave, à l'abri de la gelée, sentit une
douleur vive au testicule qui lui causa une faiblesse
le l'obligea à se mettre au lit. avant de
m'appeller, M. Longpère lui mit un Cataplasme,
tel que celui qui lui avoit réussi, l'année précédente.

L'augmentation des douleurs, la fièvre,
le Vomissement des aliments, l'infirmité des matières bilieuses
qui durèrent le tiers, le lendemain, déterminèrent à me
faire appeler le sur lendemain 27, à dix heures du soir.
je reconnus à la sensibilité et à la rougeur du Scrotum
que les Membranes propres du testicule avoient été
distendues et irritées par l'effort qu'avoit fait le
jeune homme. Les Cataplasmes Emollients et résol-
tifs furent appliqués. La fièvre, de tout journaître,
la salure de l'Urine, annoncée par l'écume de la
langue, m'empêchèrent d'avoir recours aux saignées.

je me contentai de recommander une diète rigoureuse
 et les boissons acidulées, me proposant de consulter
 mon père, il reconnut, comme moi que c'était
 une hydrocèle accompagnée d'inflammation et
 nous détrompâmes un médecin qui, non obstruant
 l' étranglement, dont j'ai parlé et l'absence des
 signes locaux, estimait que c'était une hernie
 étranglée. La Douleur et le Vomissement des matières
 bilieuses lui lui imposèrent. Le lendemain les acci-
 dents augmentèrent, on varia les Cataplasmes anodins
 émollients et résolutifs. on insista sur les boissons
 légères, le malade vomissait fréquemment, les nuits
 étaient laborieuses, enfin le 28. 9. ^{bre} à quatre heures
 du soir, nous ne crûmes avoir rien de mieux à
 faire, pour obvier à l'intensité des accidents, que
 de faire l'opération.

après avoir placé le malade, dans son lit,
 la tête un peu relevée, ainsi que les cuisses, j'incisai,



avec bien de la précaution, dans la crainte qu'il
n'y eût complication de maladie, les membranes
les unes après les autres. Parvenu dans l'intérieur
du sac de l'hydrotèle, il sortit deux gobelets —
d'eau séreuse de une petite cuillerée de pus.
je disséquai et retranchai de la tunique vaginale
qui étoit très épaisse, ainsi que l'albuginée.
L'incision s'étendoit vers le haut, jus qu'à
l'anneau et au plus bas du Scrotum. Le testicule
étoit en suppuration, j'en importai des lambeaux
de façon qu'il ne restoit plus que l'épididyme
qui étoit fort sain. Le malade ne perdit pas
beaucoup de sang. je mis de chaque côté de
l'extrémité du cordon et de l'épididyme, un
rouleau de charpie, je plaçai, dans le fond, d'autres
boudonnets roulés dans de la Colophane, et par dessus
une poignée de charpie brute, par petits pelotons
enfistés les compresses graduées et le bandage app

roprié. on fit sur le ventre des embrocations,
 avec l'huile rosat & des fomentations emollientes
 que l'on réitérait souvent. je prescrivis la
 plus grande diète, des boissons légères, telles
 que l'eau de poulet, une tisane de chiendens
 & de réglisse, une limonade légère pour le malade
 prenoit alternativement. il éprouva un soula-
 gement marqué de son opération, il dormit
 très bien, la nuit. Le vomissement s'arrêta,
 la fièvre diminua. Le lendemain matin, on avoit
 les plus grandes espérances, malheureusement le mieux
 ne se soutint pas longtemps, car dès le soir même,
 le ventre se météorisa, des maux de cœur, des nausées,
 les coliques, les anéantissements, la fièvre se
 déclarèrent. Le malade vomit une jatte pleine
 d'humeurs bilieuses & quatre gros vers vivants,
 de quatre pouces, de longueur. nous crûmes le
 mal déclaré, & il nous sembla qu'une fièvre



Vermineuse Comploquoit la maladie Chirurgicale,
Le Soulagement qui résulta de l'Éjection Des Vers Et
Du Vomissement bilieux, nous détermina à donner les
anthelminthiques en Potions Et en Lavements. malgré
Cela, la nuit fut mauvaise, quoi qu'il la passât, sans
Venir; on fit le premier pansement, trente neuf
heures, après l'opération. il y avoit un dégorgement
Considérable, Et la plaie étoit aussi belle, qu'elle
pouvoit l'être. on avoit attribué aux Vers, Les
accidents, dont je viens de parler; Et on croyoit être
d'autant mieux fondé, que la nuit suivante, il
En rejetta, toujours par le Vomissement, quatre aussi
longs qui étoient morts. il ne rendoit rien par le
bas, depuis six jours, malgré les Lavements purga-
tifs Et anti Vermineux. au second pansement qui se
fit le troisième jour de l'opération, on vit des
Vers sur le reste du testicule Et on mit, sur

quelques portions des Membranes propres, une légère dissolution de pierre à cautère: Les chairs qui se trouvoient aux environs, commençoient à rongir, mais les coliques, la fièvre, les nausées, le vomissement, la Constipation qui ne cessoient pas, inquiétoient les parents & les gens de l'art.

La tension du Ventre étoit si forte, qu'il étoit facile de reconnaître une tympanite des mieux caractérisées, cela nous décide à administrer le remède de godard (a) fait avec un gros de noix de galle, en poudre, dans six onces d'eau de fenouil & trois onces de Syrop d'althéa. Cette potion que j'avois vu réussir plusieurs fois, ne produisit aucun effet, elle dégoûta aussi le malade. Le soir du troisième jour, il rendit encore, par la bouche, quatre Strongles morts, après avoir rejeté une jatte de matières bilieuses très vertes.



(a) Journal de Médecine tom. 42. page 242.

au troisieme pansement, fais le quatrieme jour,
on apperçut que la plaie étoit belle, que des
chairs étoient vermeilles, la suppuration encore
sérénée. Le Malade naturellement patient, nous
disoit que la plaie ne l'inquiétoit pas, qu'il
desireroit qu'on recommençât son opération, pour
qu'il n'eût plus mal au ventre, qu'il voudroit
qu'on put le lui ouvrir, pour être guéri.

On essaya de le purger, avec un apozème
chicoracé & le sel cathartique amer, on lui donna
le quinquina, en infusion, des lavements purgatifs
et même drastiques.

Le cinquieme jour, le Malade rendit encore
beaucoup de bile verte & deux vers morts, il
demanda, avec instance, un vomitif. Ce qu'on
pût lui accorder, fut de lui donner l'émétique
à très petite Dose, comme purgatif, pour tâcher
d'obtenir une garde robe, mais ce fut inutilement.

La confiance des accidents lui fut tout de la tympanite
 qui résista à tous les remèdes imaginables, me fit soupçonner
 qu'il se passoit quelques scènes fâcheuses, dans le
 bas ventre. La plaie cependant étoit en bon état,
 les escarres se séparoient, les chairs étoient belles &
 paroissoient annoncer la guérison, tandis que le Mal du
 Ventre travailloit à la destruction du Sujet. il survint
 dans l'aîne du même côté, une tumeur inflammato-
 ire, oblongue, qui, pendant deux ou trois jours, augmen-
 ta le volume & le caractère de fureur, la quelle on
 appliqua des Cataplasmes emollients & résolutifs.
 nous soupçonnâmes dès lors, un épanchement. la
 plaie ne se reflétoit en rien de ce désordre, car les
 escarres tombèrent le huitième jour & le volume
 du Scrotum n'étoit pas plus gros, que dans l'état
 naturel.

aux symptômes & dessus ce joignirent l'intermittence
 du pouls, la maigreur du visage, la fièvre, la



noirceur du teint, les joues s'enfoncèrent, le nez
s'effila, les yeux se cavèrent, les inquiétudes morales
ajoutèrent aux maux physiques, le jeune homme ne
trouvoit plus aucune place bonne, il se plaignoit
vivement du Dos, enfin il succomba de 12. ^{ans} 1788,
14 jours, après l'opération.

après la mort, il y avoit dans le bas ventre &
dans le petit bassin, un épanchement considérable de
pus, d'excréments & de Matières d'un brun noirâtre,
les intestins grêles & gros avoient plus de capacité
que dans l'état ordinaire, quoique vuides en partie.
La fin du Duodénum, le commencement du jejunum,
la portion de l'iléon & du Colon qui se trouvent
à la droite de la Colonne épinière, étoient collés
& confondus ensemble: leurs tuniques externes étoient
en suppuration, ainsi que le Mésentère adjacent.

la matière qui les recouvrait, étoit putride. Il y
avoit une large ouverture au colon, près du Cæcum
par où toutes les Matières Stercorales s'étoient
échappées dans le Ventre. La partie Concave du
foie, la Vésicule Du fiel, ainsi que les intestins qui
les touchent, participoient dans leur Surface Extérieure
au désordre de reste des Viscères étoit dans l'état
naturel.

En réfléchissant sur tout ce qui s'est passé avant
et depuis l'opération de l'hydrocèle, faite au jeune
homme qui fait le sujet. De cette observation, je
suis porté à croire que l'inflammation des membr-
anes propres du testicule arrivée à la suite de
l'effort qu'il a fait, en portant la charge, dont il
a été question, s'est communiquée par le Cordon
au tissu Cellulaire et aux Membranes des Vaisseaux
Spermatiques, qu'elle a gagné les intestins juxta



posés ; que la Suppuration, qui a suivi cette inflamm-
ation, a produit une Cohésion & une Confusion de
ces parties, Entr'Elles, un ulcère qui a détruit toutes
les tuniques du Colon, se contentant d'attaquer les
plus externes des autres intestins &c. que cette
destruction qui ne s'est pas faite, sans des plus Vives
douleurs, a causé l'Épanchement. qu'enfin cet
Épanchement a occasionné la gangrène, le Syphacèle
& la mort.

Étoit-il possible de sauver le jeune homme,
en pratiquant l'opération vingt quatre heures plutôt ?
falloit-il le saigner plusieurs fois, malgré les Cont-
r'indications, dont j'ai fait mention ?

ne devoit-on pas espérer quelque avantage de
la Diète rigoureuse, des remèdes internes & externes ?
de la grande jeunasse, en fin ? Ce sont autant

De questions, Pour je laisse la Décision à Mes Maîtres
à nancy le 26. X^{bre} 1788.

La flûte, fils,

Professeur Royal Du Collège de
Chirurgie de nancy, Chirurgien
Apprendi' de la même Ville.



the question now is how to get the

the name of the

the name of the

the name of the